

Su procedimiento está programado para el:

Hora de llegada:

Médico:

Lugar: Howard University Hospital

Consultorio de endoscopia B500

Instrucciones para la preparación intestinal para su colonoscopia

Paso 1: Después de programar su colonoscopia

- Recoja su kit de preparación intestinal (GoLYTELY) en la farmacia tan pronto como sea posible después de que se emita la orden.

Paso 2: Instrucciones en cuanto a medicamentos

Anticoagulantes

- ☐ **Xarelto®, Eliquis®:** suspéndalos desde **3 días** antes de su procedimiento.
- ☐ **Plavix®:** suspéndalo desde **5 días** antes de su procedimiento.
- ☐ **Coumadin®:** suspéndalo desde **5 días** antes de su procedimiento.

Insulina

- ☐ **Insulina de acción rápida:** no se la administre el día del procedimiento.
- ☐ **Insulina de acción prolongada:** adminístrese la mitad de su dosis habitual la noche anterior a su procedimiento.

Agonistas del GLP-1 (utilizados para la diabetes o la pérdida de peso)

- ☐ **Inyectables (p. ej., Ozempic®, Wegovy®, Trulicity®, Zepbound®, BCise® y Mounjaro®):** suspéndalos desde **1 semana** antes de su procedimiento.
- ☐ **Por vía oral (p. ej., Victoza®, Saxenda®, Byetta® y Adlyxin®):** suspéndalos desde **24 horas** antes de su procedimiento.

Paso 3: El día antes de su colonoscopia

- Debe beber solo líquidos claros a partir de la mañana. **Nada de alimentos sólidos.**
- Algunos ejemplos de líquidos claros incluyen agua, caldo claro, jugo de manzana, té, café (**sin leche**) y Gatorade sin color.
- No consuma lácteos, alcohol ni nada de color rojo, azul o morado.**



Paso 4: Instrucciones para la preparación intestinal

Noche antes del procedimiento

- Beba la mitad de su preparado intestinal entre las 6 p. m. y las 8 p. m.**

Día del procedimiento

- Beba la mitad restante de su preparado intestinal entre las 4 a. m. y las 6 a. m.**
- Termine todo el preparado al menos 2 horas antes de su hora de llegada.
- NO beba nada después de terminarse el preparado intestinal.
- Puede tomar los medicamentos matutinos esenciales (como medicamentos para la presión arterial, la tiroides, las convulsiones y el corazón) con un sorbo de agua, a menos que se le indique lo contrario.
- No tome ningún medicamento oral para la diabetes la mañana de su procedimiento.**
- Use ropa cómoda y evite traer objetos de valor.



¡¡¡Recuerde!!!

- Traiga su identificación, tarjeta del seguro y lista de medicamentos.
- Un adulto responsable debe acompañarle y estar disponible para llevarle a casa después del procedimiento.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el Departamento de Gastroenterología llamando al **202-865-1374** entre las 9:30 a. m. y las 4:30 p. m. Para obtener asistencia fuera del horario de atención, llame al **202-865-6100** y pregunte por el médico de guardia de gastroenterología. Él/ella podrá atender sus inquietudes.